

Magnesio Plus

Quelato de Aminoácido de Magnesio Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM **MagnesioPlus** es un biestimulante líquido en base a Magnesio, Nitrógeno, extracto de algas marinas, polioles naturales, aminoácidos, lo que lo hace ser un producto completo y de alta eficiencia.

NUTRIFARM **MagnesioPlus** actúa estimulando el metabolismo de la planta a través de una mayor actividad fotosintética de la planta, además equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de las células, de manera integral, desarrollando su potencial productivo.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM **MagnesioPlus** se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitación.

Carencia:

NUTRIFARM **MagnesioPlus** no tiene restricciones de carencia.

Composición Mínima:

 Magnesio (MgO)	8 %	p/v
 Nitrogeno (N)	4 %	p/v

Uso y Recomendaciones

<i>Cultivo</i>	<i>Dosis Litros/ha cc/litro agua</i>	<i>Nº de aplicaciones</i>	<i>Momento de aplicación</i>
Naranjos, Limoneros, Pomelos, Mandarinos, Olivos, Paltos	4 L/ha 400 cc 100 L agua	2	1ª inducción brotes de primavera. 2ª inducción de brotes de otoño.
Vid de mesa, Vid vinífera, Vid pisquera	3-5 L/ha 300-500 cc/100 L agua	2	Desde brotación (brotes sobre 25 cm.) como corrector y preventivo de clorosis.
Ármandanos, Frutillas, Moras, Frambuesas	3 L/ha 300-400 cc/100	2- 3	Desde inicio de brotación.
Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Ciruelo, Nectarines, Damasco	3-5 L/ha 300-400 cc/100 L agua	2- 3	Desde brotación a viraje color fruta.
Peral, Manzano, Kiwi	3-5 L/ha 300-400 cc/100 L agua	1- 2	Desde fruto con 2 cm. de diámetro hasta inicio de pinta.
Melones, Sandías, Pepinos, Zapallos	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	2- 3	Desde 5 a 10 días de post trasplante hasta pinta de frutos.
Tomates, Ají, Pimientos	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	2- 3	Desde 5 a 10 días de post trasplante hasta pinta de fruto.
Maíz grano y Semillero, Leguminosas y Gramíneros en general	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	1- 2	Desde 4ª hoja verdadera según necesidades del cultivo.
Hortalizas de hojas	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	2- 3	Desde establecimiento. Repetir cada 10 días.
Brócoli, Coliflor, Ajo, Cebolla, Puerro, Cebollín Repollo	1-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	1	Durante todas las etapas fenológicas del cultivo.
papa, Camote	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	1- 3	40 días antes de cosecha.
Ornamentales	2-3 L/ha 250-300 cc/100 L agua	1- 6	Durante todo el período vegetativo, con la finalidad de mantener el color verde de hojas.